

Πίνακας φαρμακευτικών σκευασμάτων Tabernil

Συμπτώματα	Αίτια	Προϊόν	Σύνθεση	Δοσολογία	Συσκευασία
Θνησιμότητα νεοσσών, εμβρυική θνησιμότητα, εμφάνιση πολυάριθμων άγονων αυγών	Λοιμώξεις που εμφανίζονται κατά τις πρώτες ημέρες ζωής (κολιβακίλλωση, σαλμονέλλωση, κ.α)	TABERNIL CRIA	Τετρακυκλίνη, ωεομυκίνη, φουραλταδόνη, βιταμίνες A, C, K, E, B1, B2, B6, B12	4-5gr/Kg πάστας των νεοσσών τις πρώτες 15-20 ημέρες ζωής τους. Ενήλικα πουλιά: 5-10gr/lit νερού για 5-6 συνεχείς ημέρες	Κουτί με 10 φακελάκια των 10 gr
Διάρροιες που προκαλούν αφυδάτωση και σε σοβαρές περιπτώσεις αδυναμία και θάνατο	Γαστρεντερικές λοιμώξεις από διάφορα βακτήρια (Salmonella, E.coli, Staphylococcus, Pseudomonas, κ.α)	TABERNIL GENTAMICINA	Γενταμυκίνη	5 ml/lit ή 4 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού για 3-5 συνεχείς ημέρες	200ml
Ανησυχία, εγκατάλειψη της φωλιάς, απώλεια πτερώματος λόγω κνησμού, προοδευτική απίσχανση	Προσβολή από εξωπαράσιτα (ψείρες, ακάρεα, κ.α)	TABERNIL INSECTICIDA Sray/Polvo	Τετραμεθρίνη, P.B.O.	Ψεκάστε (απόσταση 50cm) πάνω στο πτέρωμα για μερικά sec. Επίσης, ψεκάστε φωλιές, ξύλα, κ.α.	Spray 150ml, 400ml, 750ml, Σκόνη 70gr
Εφελκίδες, πιτυρίαση, οζίδια, φλεγμονή από κνησμό	Προσβολή και αλλοιώσεις από εξωπαράσιτα, δήγματα εντόμων, κλπ	TABERNIL ROMADA	Σαλικυλικό οξύ, σκόνη θείου, δεξαμεθαζόνη, βενζοκαΐνη, βιτ. A, ανάκυκλος ο πύρεθρος	Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στις αλλοιώσεις	Σωληνάριο των 75gr
Διάρροια, αναμία, έντονη δίψα, απίσχανση, πτερόρροια, προθανάτια κατάσταση	Προσβολή από ενδοπαράσιτα Ascaridia columbae, Capilaria spp, Heterakiw spp, Amidostomum	TABERNIL VERMICIDA	Λεβαμιζόλη	2ml/lit ή 2 σταγόνες/40ml για 1 μόνο ημέρα, και επανάληψη μετά από 2 ημέρες	20ml
Διάρροια, κιτρινίλευκη ή ερυθρωπή, εξάντληση, προοδευτική απίσχανση	Εντερίτιδα από κοκκίδια	TABERNIL SULFA	Σουλφακινιοξαλίνη, πυριμεθαμίνη	1,5ml/lit ή 3 σταγόνες/100ml πόσιμου νερού για 3 συνεχείς ημέρες και επανάληψη μετά από 2 ημέρες	20ml
Σταμάτημα του τραγουδιού (στα αρσενικά)	Έλλειψη ορμονών ή και βιταμινών	TABERNIL CANTO	Μεθυλτεστοστερόνη, Βιταμίνες A, D3, E	10ml/lit ή 25 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού 2-3 φορές/εβδομάδα. Σε διαγωνισμό: 4-5 φορές/εβδομάδα	20ml
Ασθματική συμπτωματολογία με ή χωρίς ρόγχους, δύσπνοια, αφωνία και συριγμοί	Εξασθένηση αναπνευστικής λειτουργίας από αίτια οργανικά, αλλεργικά ή κληρονομικά	TABERNIL ANTIASMATICO	Διφαινυδραμίνη, εφεδρίνη, θεοφυλλίνη, δεξαμεθαζόνη	5-10 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού για 5 συνεχείς ημέρες	20ml
Φτωχός χρωματισμός σε ερυθρόχρωμα καναρίνια	Διατροφή ελλιπούς σε χρωστικές ουσίες	TABERNIL COLOR	Σταθεροποιημένα παράγωγα καροτενοειδών	5 σταγόνες/καναρίνι/ημέρα ή 20ml/200gr πάστας ή γαλέτας	20ml
Μείωση Libido, στειρότητα αρσενικών, αγωνιμότητα θηλυκών, μείωση εκκολαπτικότητα αυγών, δυστροφία σκελετικών μυών	Στερητικά νοσήματα από ανεπαρκή ή μη ισορροπημένη πρόσληψη βιταμινών A, D3, E	TABERNIL AD3E	Βιταμίνες A, D, E	4ml/lit ή 4 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού καθημερινά για 20 ημέρες πριν το ζευγάρισμα	20ml

Νευρολογική εκφύλιση, καθυστερημένη ανάπτυξη, αγονιμότητα, ελλάτωση του αριθμού των αυγών και της εκκολαπτικότητας, αδυναμία μετά από αντιβιοθεραπεία, αναμμία, ανορεξία, ευπάθεια σε μολυσματικές ασθένειες	Στερητικά νοσήματα λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βιταμινών συμπλέγματος Β, ή λόγω μακρόχρονης θεραπείας με αντιβιοτικά	TABERNIL COMPLEJO B	Βιταμίνες Β1, Β2, Β6. νικοτιναμίδη, παντοθενικό οξύ	4ml/lit ή 4 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού για 5-10 ημέρες	20ml
Πτερόρροια φυσιολογική (εποχή) ή παθολογική	Νοσήματα λοιμώδη, παρασιτικά, περιβαλλοντικά ή διατροφικά	TABERNIL MUDA	Χολίνη, dl-μεθειονίνη, νικοτιναμίδη, παντοθενικό οξύ, βιταμίνη Β6	3ml/lit ή 3 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού για 15 συνεχείς ημέρες, μετά παύση 5 ημερών και επανάληψη για 15 ημέρες	20ml
Γενική εξασθένηση κατά την διάρκεια και κατά την ανάρρωση από οποιαδήποτε ασθένεια, καθυστερημένη ανάπτυξη	Διατροφική έλλειψη βιταμινών και αμινοξέων	TABERNIL TOTAL	Βιταμίνες Α, D3, Ε, Β1, Β2, Β6, C, Κ3, νικοτιναμίδη, μεθειονίνη, χολίνη, παντοθενικό οξύ	3ml/lit ή 3 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού. Επίσης μπορεί να προστεθεί στην πάστα των νεοσσών ή στο μίγμα αναπ/γής 5ml/500gr	20ml
Παραμορφωμένο ράμφος ή και οστά, λεπτοκέλυφα αυγά	Ασβεστιοπενία λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης ασβεστίου, ή λόγω μη ισορροπημένης χορήγησης άλλων απαραίτητων συστατικών	TABERNIL CALCIO	Γλυκονικό ασβέστιο, σακχαρώδες ασβέστιο	15 σταγόνες/40ml για 15 ημέρες πριν την περίοδο της ωοτοκίας ή 5 σταγόνες/40ml για 5-15 ημέρες	20ml
Κατάπτωση, απώλεια ζωτικότητας, μείωση κατανάλωσης τροφής και νερού, ελαφρά διάρροια	Λοίμωξη προκαλούμενη από στρεσοτικές καταστάσεις: απότομες αλλαγές θερ/σίας, διατροφής, μετακινήσεις	TABERNIL ANTISTRESS	Χλωραμφενικόλη, φουραλαζόνη, βιταμίνες Α, C, Κ3	4-5ml/lit ή 4-5 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού για 4-5 συνεχείς ημέρες	20ml
Βήχας, παρμός, ρόγχοι, προοδευτική απίσχανση, διάρροια	Βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού (XAN) ή του πεπτικού συστήματος	TABERNIL ANTIBIOTICO	Ερυθρομυκίνη, χλωραμφενικόλη, δεξαμεθαζόνη, βιταμίνες Α, C, Κ, Β1, Β2, Β12	4-5ml/lit ή 5 σταγόνες/40ml πόσιμου νερού για 5 συνεχείς ημέρες	20ml